

	KIPI			
	SOP	No. Dokumen : Sop/Ukm/Imunisasi/011		
		No. Revisi : 011		
		Tanggal Terbit : 26-12-2017		
		Halaman 1/2		
UPT PUSKESMAS MPUNDA			Nurahdiah, Amd. Keb Nip:196612311986032087	
1. Pengertian	Kejadian medic simpang yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa efek vaksin maupun efek simpang, toksisitas, reaksi sensititas, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.			
2. Tujuan	Untuk mendeteksi dini, merespon KIPI dengan cepat dan tepat, mengurangi dampak negatif imunisasi terhadap kesehatan individu dan terhadap imunisasi			
3. Kebijakan	Keputusan kepala puskesmas mpunda nomor : 445/26/1/2016 Tentang : jenis-jenis pelayanan.			
4. Referensi	Direktorat jenderal PPM dan PL departemen kesehatan RI Jakarta tahun 2005.			
5. Prosedur/langkah-langkah	1. Prosedur : • Alat : 1. Kain bersih (kain kompres) 2. Sput • Bahan : 1. Sput 2. Obat Epinepril 2. Langkah-langkah : 1. Kompres air hangat (Bila Bengkak / Merah pada daerah suntik) 2. Bila Shock (Diberikan suntikan Epinepril : dosis untuk bayi = 0,03 ml, dosi untuk Anak 0,5 ml) disutikan secara IM (Intra Muskuler)			

